

KURZPROTOKOLL
HD 17

Öffentlicher Titel	Behandlungsoptimierungsstudie in der first-line Behandlung von intermediären Stadien beim Hodgkin-Lymphom
Wissenschaftl. Titel	HD17 for Intermediate Stages - Treatment Optimization Trial in the First-Line Treatment of Intermediate Stage Hodgkin Lymphoma
Kurztitel	HD 17
Studienart	multizentrisch, randomisiert, offen/unverblindet, zweiarmig
Studienphase	Phase II
Erkrankung	Blut: Hodgkin-Lymphome: Neu diagnostiziert / de novo
Ziele	- Progression Free Survival - Overall Survival - CR rate
Einschlusskriterien	- Hodgkin Lymphoma - CS I, II with risk factor (stage IIB with risk factor 1 or 2 are not included) - large mediastinal mass (>1/3 of maximum transverse thorax diameter) - extranodal involvement elevated ESR 3 or more involved nodal areas - written informed consent
Ausschlusskriterien	- Leucocytes <3000/μl - Platelets < 100000/μl - Hodgkin Lymphoma as composite lymphoma - Activity Index (WHO) >2
Alter	18 Jahre und älter
Fallzahl	1100
Sponsor	Universität Köln (Hauptsponsor)
Förderer	Universität Köln
Registrierung in anderen Studienregistern	ClinicalTrials.gov NCT01356680 (primäres Register)
Therapie	Drug: BEACOPPescalated (Bleomycin, Etoposide, Adriamycin, Cyclophosphamide, Vincristine, Procarbazine, Prednisone) Drug: ABVD (Adriamycin, Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine)